

ALTERACIONES ELÉCTRICAS EN LA AMILOIDOSIS CARDÍACA POR TRANSTIRRETINA

Pedro Touzas · Santiago Decotto · Florencia Cantora · Rocio Blanco · M. L. Posadas-Martínez · M. Carretero · E. Brulc · E. Nucifora · G. Maid · R. Pizarro · M. A. Aguirre · D. Pérez de Arenaza

Hospital Italiano de Buenos Aires · Cohorte ATTR-CM 2011–2025

OBJETIVO

Describir los hallazgos electrocardiográficos al diagnóstico y la incidencia de fibrilación auricular (FA) y requerimiento de marcapasos durante el seguimiento

MÉTODOS

Cohorte retrospectiva unicéntrica de pacientes con ATTR-CM confirmada. Se analizaron ECG basales y eventos eléctricos incidentes. Se calcularon incidencia acumulada y tasas por 100 personas-año.

COHORTE

205

pacientes

80 ± 8

años

82,9%


varones

91,2%

ATTRwt

CARGA ELÉCTRICA AL DIAGNÓSTICO

Prevalencia, %



ECG basal disponible en 202 pacientes

NUEVOS EVENTOS EN EL SEGUIMIENTO

Seguimiento mediano
1,9 años [RIC 0,9–3,3]

20,8%

FA de novo
22 eventos

9,42 por 100 personas-año
IC95% 5,91–14,27

5,8%

Marcapasos
11 eventos

2,60 por 100 personas-año
IC95% 1,30–4,64

MENSAJE CLAVE La ATTR-CM presenta una alta carga eléctrica basal y una progresión clínicamente relevante durante el seguimiento.

CARACTERÍSTICAS ELECTROCARDIOGRÁFICAS Y EVOLUCIÓN DE LOS TRASTORNOS ELÉCTRICOS EN PACIENTES CON AMILOIDOSIS CARDÍACA POR TRANSTIRETINA.

Pedro Touzas, Santiago Decotto, Pilar Domenech, María Adela Aguirre, María Lourdes Posadas Martínez, Elsa Nucifora, Gustavo Maid, Diego Perez de Arenaza.

OBJETIVO Y MÉTODOS

Cohorte retrospectiva unicéntrica de ATTR-CM tanto wild-type como variante (2011-2025). Describir los hallazgos electrocardiográficos al diagnóstico y la prevalencia e incidencia de FA e implante de marcapasos.

Se calcularon incidencias acumuladas y tasas de incidencia de eventos por 100 personas-año para nueva FA o implante de MCP


HALLAZGOS CLAVE

66,3% patrón de pseudoinfarto
48,3% FA al diagnóstico
20,8% desarrolló FA de novo
5,8% requirió marcapasos


Alta carga eléctrica al diagnóstico, con progresión durante el seguimiento.

RESULTADOS

n= 205, 187 ATTR-wt y 18 ATTR-v. Edad media al diagnóstico de $80,4 \pm 8,1$ años y el 82,9% hombres



INCIDENCIA ACUMULADA DURANTE EL SEGUIMIENTO



CARACTERÍSTICAS ELECTROCARDIOGRÁFICAS Y EVOLUCIÓN DE LOS TRASTORNOS ELÉCTRICOS EN PACIENTES CON AMILOIDOSIS CARDÍACA POR TRANSTIRETINA.

Pedro Touzas, Santiago Decotto, Pilar Domenech, María Adela Aguirre, María Lourdes Posadas Martínez, Elsa Nucifora, Gustavo Maid, Diego Perez de Arenaza.

OBJETIVO Y MÉTODOS

Cohorte retrospectiva unicéntrica de ATTR-CM tanto wild-type como variante (2011-2025). Describir los hallazgos electrocardiográficos al diagnóstico y la prevalencia e incidencia de FA e implante de marcapasos.

Se calcularon incidencias acumuladas y tasas de incidencia de eventos por 100 personas-año para nueva FA o implante de MCP.


HALLAZGOS CLAVE

66,3% patrón de pseudoinfarto
48,3% FA al diagnóstico
20,8% desarrolló FA de novo
5,8% requirió marcapasos

Alta carga de alteraciones eléctricas al diagnóstico, con progresión durante el seguimiento.

RESULTADOS

n= 205, 187 ATTR-wt y 18 ATTR-v. Edad media al diagnóstico de $80,4 \pm 8,1$ años y el 82,9% hombres



INCIDENCIA ACUMULADA DURANTE EL SEGUIMIENTO, mediana 1,9 años [RIC 0,9–3,3]

